



Přikrmování

- a) v zimě se přikrmuje na krmelištích a zásypech, zajišťují se dočasná přikrmovací místa – vázání otýpek sena pro zajíce, prohazování křovin, v nichž zimují bažanti krmivem
- b) krmiva rozdělujeme: **objemová** – obsahují málo živin, jetel, vojtěška, sladká sena z luk a pastvin, letnina (usušené větvičky dubu, lípy, jasanu, jívy, jeřábu, osiky, břízy, maliní, borůvčí, kopřiv atd.) sklizené v červnu, kdy má největší výživnou hodnotu
- jadrná** – obsahují hodně živin, obiloviny, luskoviny, semena olejnin a dřevin, pokrutiny, (výlisky semen) a speciální krmné směsi pro zvěř, pro pernatou zvěř jsou významná semena plevelů, odpad od mlátiček, apod.
- dužnatá** – mají význam pro vegetační obsah vody, jeřabiny, šípky, bezinky, trnky a ovocné výlisky, nepřekládat v době mrazů
- c) **objemové** krmivo se zvěři předkládá v krmelcích, jsou hlavní, menší pojízdné nebo přenosné, pro **jadrné** krmivo se používají automatické krmelce, většinou postačí korýtka krytá stříškou (hlavní korýtka), nebo menší, do nichž se jadrné krmivo donáší
- d) **krmelce pro zajíce a králíky** jsou jednoduché a většinou je tvoří stříška, nebo dvě překřížené tyčky na kůlu, na něž se zavěsí otýpka sena nebo letniny tak, aby neležela na zemi (dřevěné konstrukce krmelců se dvakrát do roka řádně očistí horkou vodou nebo vodou s vápenným mlékem, celý krmelec se pak natírá vápnem)
- e) **slaniska (lizy)** – ve vydlabaném pařezu, na stromovém rozštěpu krytém stříškou, stojí poblíž ochozů a krmelců, protože spárkatá zvěř má nedostatek sodíku